

プロトコール名 胃癌 G-SOX療法

適応 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与期間 3週(2週投与、1週休薬)を1コースとして、効果がある限り継続

投与計画

薬剤名	基準量
エルプラット	100 mg/m ²
TS-1	下記参照

国内試験において100mg/m²が開始用量となっているため、130mg/m²ではなく100mg/m²としている

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
エルプラット	100mg/m ²		↓																					
TS-1																								

①グラニセトロン1B+オルガドロン4A(30min)

②5%ブドウ糖500ml+エルプラット 100mg/m² (2hr)

③5%ブドウ糖50ml(5min) (Day 1)

●TS-1 1日2回朝夕食後(Day1夕食後~服用) (Day1-14)

体表面積<1. 25m² 40mg/回

1. 25m²≤体表面積<1. 50m² 50mg/回

1. 50m²≤体表面積 60mg/回

グラニセトロン オルガドロン	エルプラット 5%ブドウ糖500ml	5%ブドウ糖50ml
30分	2時間	5分

エルプラットは5%ブドウ糖注で希釈すること

●休薬・減量基準

好中球数	1500/mm ³ 以上で実施可能
血小板数	7.5万/mm ³ 以上で実施可能

・腎機能に応じて、TS-1の減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	80以上	60以上80未満	30以上60未満	30未満
投与量	初回基準量	初回基準量	原則として1段階以上の減量	禁忌

※30～40未満は2段階減量が望ましい

初版 2020.6.15 作成

2版 2020.10.10 更新