

プロトコール名 大腸癌 XELOX療法

- 適応 ①治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
②結腸癌における術後補助化学療法

- 投与期間 ①3週(2週投与、1週休薬)を1コースとして、効果がある限り継続
②3週(2週投与、1週休薬)を1コースとして、8サイクル

投与計画	薬剤名	基準量
	エルプラット	130 mg/m ²
	ゼローダ [®]	下記参照

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エルプラット	130mg/m ²		↓																				
ゼローダ			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

①グラニセトロン1B+オルガドロン4A(30min)

②5%ブドウ糖500ml+エルプラット 130mg/m² (2hr)

③5%ブドウ糖50ml(5min) (Day 1)

●ゼローダ[®] 1日2回朝夕食後(Day1夕食後～服用) :C法 (Day1-14)

体表面積<1.36m ²	1200mg/回(1回4錠)
1.36m ² ≤体表面積<1.66m ²	1500mg/回(1回5錠)
1.66m ² ≤体表面積<1.96m ²	1800mg/回(1回6錠)
1.96m ² ≤体表面積	2100mg/回(1回7錠)

グラニセトロン オルガドロン	エルプラット 5%ブドウ糖500ml	5%ブドウ糖50ml
30分	2時間	5分

エルプラットは5%ブドウ糖注で希釈すること

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

好中球数	1500/mm ³ 以上で実施可能
血小板数	7.5万/mm ³ 以上で実施可能

・腎機能に応じて、ゼローダの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	51以上	30以上50以下	30未満
投与量	初回基準量	1段階減量	禁忌