

プロトコール名 悪性骨・軟部腫瘍 IFM-DXR療法

適応 悪性骨・軟部腫瘍

投与期間 3週を1コースとして、術前に3コース、術後に2コース施行される

投与計画

薬剤名	基準量
アドリアシン	30 mg/m <sup>2</sup>
イホマイド	2 g/m <sup>2</sup>
ウロミテキサン	1600 mg/m <sup>2</sup>

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アドリアシン	30mg/m <sup>2</sup>		↓	↓																			
イホマイド	2g/m <sup>2</sup>		↓	↓	↓	↓	↓																
ウロミテキサン	1600mg/m <sup>2</sup>		↓	↓	↓	↓	↓																

(day1、2)

- ①ソルデム3A 500ml × 2 (4hr)
- ②グラニセロン1B+オルガドロン4A(30min)
- ③生食100ml+アドリアシン 30mg/m<sup>2</sup>(2hr)
- ④生食250ml+イホマイド 2g/m<sup>2</sup> (4hr)
- ⑤生食50ml+ウロミテキサン 1600mg/m<sup>2</sup>/day イホマイド終了直後、4時間後、8時間後に投与 (30min)
- ⑥ソルラクト 500ml × 2 (4hr)

ソルデム3A 500ml×2	グラニセロン オルガドロン	アドリアシン 生食100ml	イホマイド 生食250ml	ウロミテキサン 生食50ml	ウロミテキサン 生食50ml	ソルラクト 500ml	ウロミテキサン 生食50ml	ソルラクト 500ml
4時間	30分	2時間	4時間	30分	30分	2時間	30分	2時間

(day3、4、5)

- ①ソルデム3A 500ml × 2 (4hr)
- ②グラニセロン1B+オルガドロン4A(30min)
- ③生食250ml+イホマイド 2g/m<sup>2</sup> (4hr)
- ④生食50ml+ウロミテキサン 1600mg/m<sup>2</sup>/day イホマイド終了直後、4時間後、8時間後に投与 (30min)
- ⑤ソルラクト 500ml × 2 (4hr)

ソルデム3A 500ml×2	グラニセロン オルガドロン	イホマイド 生食250ml	ウロミテキサン 生食50ml	ウロミテキサン 生食50ml	ソルラクト 500ml	ウロミテキサン 生食50ml	ソルラクト 500ml
4時間	30分	4時間	30分	30分	2時間	30分	2時間

**アドリアシンは総投与量500mgを超えないこと！**

**イホマイドは1コースでの総投与量10g/m<sup>2</sup>を超えないこと！**

イホマイドは1gあたり25mLの生食で溶解すること

