

プロトコール名 前立腺癌 DOC療法

適応 ホルモン抵抗性前立腺癌

投与期間 点滴は3週に1回投与、内服は連日投与

投与計画

薬剤名	基準量
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン	10 mg/body

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>		↓																				
プレドニン	10mg/body		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

- ①グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ②生食500ml+ドセタキセル 75mg/m<sup>2</sup> (3hr)
- ③生食50ml (5min) (Day1)
- プレドニン(5)2錠 1日1回朝食後 (Day1-21)

グラニセトロン オルガドロン	ドセタキセル 生食500ml	生食50ml
30分	3時間	5分

FN発生率10~20%  
⇒ハイリスク患者ではジーラスタ使用可

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

---

---

好中球数	2000/mm <sup>3</sup> 以上で実施可能
------	------------------------------

---