

プロトコール名 前立腺癌 ジェブタナ療法

適応 去勢抵抗性前立腺癌

条件 ドセタキセル無効の症例に限る

投与期間 点滴は3週に1回投与、内服は連日投与

投与計画	薬剤名	基準量
	ジェブタナ	25 mg/m ²
	プレドニン	10 mg/body
	ジーラスタ	3.6 mg/body

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェブタナ	25mg/m ²		↓																				
ジーラスタ	3.6mg/body				↓																		
プレドニン	10mg/body		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

- ①生食100ml(ルートフラッシュ用)
- ②生食50ml+ビスマラー1A(30min)
- ③生食20ml+ファモチジン20mg 1A (iv)
- ④グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ⑤生食250ml+ジェブタナ 25mg/m² (1hr)
- ⑥生食50ml (5min) (Day1)
- プレドニン(5)2錠 1日1回朝食後 (Day1-21)
- ジーラスタ 3.6mg (Day3)

ファモチジンiv				
↓				
生食100ml	ビスマラー 生食50ml 30分	グラニセトロン オルガドロン 30分	ジェブタナ 生食250ml 1時間	生食50ml 5分

ジェブタナは0.22ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与すること
ジェブタナ投与時はPVC製の輸液バッグ及びポリウレタン製の点滴セットを使用しないこと

FN発生率20%以上
⇒ジーラスタ投与は必須

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

好中球数	2000/mm ³ 以上で実施可能
------	------------------------------

※休薬した場合、次クール以降は20mg/m²に減量すること