

プロトコール名 膀胱癌・腎盂尿管癌 M-VAC療法

適応 膀胱癌・腎盂尿管癌

投与期間 4週を1コースとして使用

投与計画

薬剤名	基準量
メソトレキセート	30 mg/m ²
エクザール	3 mg/m ²
アドリアシン	30 mg/m ²
ランダ	70 mg/m ²

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
メソトレキセート	30mg/m ²			↓														↓						↓						
エクザール	3mg/m ²				↓																				↓					
アドリアシン	30mg/m ²				↓																									
ランダ	70mg/m ²				↓																									

(day1)

- ①グラニセロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ②生食250ml+メソトレキセート 30mg/m² (1hr)
- ③生食50ml (5min)

グラニセロン オルガドロン	メソトレキセート 生食250ml	生食50ml
30分	1時間	5分

(day2)

- ①ソルデム3A 500ml × 2 (4hr)
- ②グラニセロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ③生食50ml+エクザール 3mg/m² (30min)
- ④生食100ml+アドリアシン 30mg/m² (30min)
- ⑤生食500ml+ランダ 70mg/m² (2hr)
- ⑥ソルラクト 500ml × 3 (6hr)

ソルデム3A 500ml × 2	グラニセロン オルガドロン	エクザール 生食50ml	アドリアシン 生食100ml	ランダ 生食500ml	ソルラクト 500ml × 3
4時間	30分	30分	30分	2時間	6時間

(day15、22)

- ①グラニセロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ②生食250ml+メソトレキセート 30mg/m² (1hr)
- ③生食50ml+エクザール 3mg/m² (30min)
- ④生食50ml (5min)

グラニセロン オルガドロン	メソトレキセート 生食250ml	エクザール 生食50ml	生食50ml
30分	1時間	30分	5分

FN発生率20%以上
 ⇒ジーラスタの使用可

ランダは500mL以上の生食で希釈すること

アドリアシンは総投与量500mg/m²を超えないこと！

●休薬・減量基準

・腎機能に応じて、ランダの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	60以上	45を超え60未満	30を超え45以下	30以下
投与量	減量なし	25%減量	50%減量	禁忌

・腎機能に応じて、メソトレキサートの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	60以上	15以上60未満	15未満
投与量	減量なし	50%減量	禁忌