

プロトコール名 乳癌 weekly PTX療法

- 適応 ①術前、または術後補助化学療法  
 ②転移・再発乳癌


- 投与期間 ①weekly法(3週間投与1週間休薬)で12回投与  
 ②3週間投与1週間休薬、腫瘍の進行あるいはコントロール不能な副作用の出現まで投与

投与計画

薬剤名	基準量
パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>			↓						↓							↓													

- ①生食100ml(ラインキープ)
- ②生食50ml+ビスマラー1A(30min)
- ③生食20ml+ファモチジン20mg 1A (iv)
- ④グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ⑤生食250ml+パクリタキセル 100mg/m<sup>2</sup> (1hr)
- ⑥生食50ml (5min)



パクリタキセルは0.22ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与すること  
 パクリタキセルはDEHPフリーの点滴セットを使用して投与すること

パクリタキセル製剤は無水エタノールを含むため、アルコール過敏の有無・通院方法を確認

●休薬・減量基準

・次表の基準を満たせば、実施可能

	day 1	day 8 及び day 15
白血球数	3000/mm <sup>3</sup> 以上	2000/mm <sup>3</sup> 以上
好中球数	1500/mm <sup>3</sup> 以上	1000/mm <sup>3</sup> 以上

※白血球数 1000/mm<sup>3</sup>未満となったら、次回の投与量を減量すること

減量段階	投与量
通常量	100mg/m <sup>2</sup>
1段階減量	80mg/m <sup>2</sup>
2段階減量	60mg/m <sup>2</sup>

・次表を目安に減量をおこなう

AST・ALT		T-Bil	投与量
10×ULN未満	かつ	1.26~2×ULN	25%減量
10×ULN未満	かつ	2.01~5×ULN	50%減量
10×ULN以上	または	5×ULNを超える	中止