

プロトコール名 乳癌 weekly nab-PTX療法

適応 乳癌

投与期間 3週間投与1週間休薬

投与計画

薬剤名	基準量
アブラキサン	100 mg/m ²

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アブラキサン	100mg/m ²		↓							↓							↓													

- ①生食100ml(ラインキープ、ルートフラッシュ用)
- ②グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ③生食50ml+アブラキサン 100mg/m² (30min) **投与前、生食にてルートフラッシュ**
- ④生食50ml (5min)

生食100ml	グラニセトロン オルガドロン 30分	アブラキサン 生食50ml 30分	生食50ml 5分
---------	--------------------------	-------------------------	--------------

アブラキサン投与時はインラインフィルターを通さないこと

アブラキサンは特定生物由来製品であるため使用記録を20年間保管すること

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

好中球数	1000/mm ³ 以上で実施可能
血小板数	7.5万/mm ³ 以上で実施可能
AST・ALT	2.5×ULN以下で実施可能 (肝転移症例では5×ULNまで可)