

プロトコール名 胃癌（短）S-1+CDDP療法

適応 切除不能進行・再発胃癌

条件 入院困難かつ経口での水分摂取を積極的におこなえる症例に限る

投与期間 2週間投与、1週間休薬 不応まで繰り返す

投与計画

薬剤名	基準量
ランダ	60 mg/m ²
TS-1	下記参照

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TS-1			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
ランダ	60mg/m ²		↓																				

●TS-1 1日2回朝夕食後 (Day1-14)

体表面積<1.25m² 40mg/回

1.25m²≤体表面積<1.50m² 50mg/回

1.50m²≤体表面積 60mg/回

①ソルデム3A 500ml+硫酸Mg 0.4A(1hr)

②グラニセトロン1B+オルガドロン4A(15min)

③生食500ml+ランダ 60mg/m² (2hr)

④ソルデム3A 500ml+フロセミド20mg 1A(1hr)

⑤生食500ml (1hr)

硫酸Mg ソルデム3A 500ml 1時間	グラニセトロン オルガドロン 15分	ランダ 生食500ml 2時間	フロセミド ソルデム3A 500ml 1時間	生食500ml 1時間
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------

ランダは500mL以上の生食で希釈すること

●休薬・減量基準

・腎機能に応じて、TS-1及びランダの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	80以上	60以上80未満	50未満
投与量	初回基準量	初回基準量 ※必要に応じて1段階減量	使用経験なし