

プロトコール名 胃癌 CPT-11+CDDP療法

適応 切除不能進行・再発胃癌

投与期間 2週ごとに投与

投与計画

薬剤名	基準量
カンプト	60 mg/m ²
ランダ	30 mg/m ²

UGT1A1遺伝子検査結果

年 月 日

-/-

:減量不要

-/*6 又は -/*28

:減量不要

*6/*6 又は *28/*28 又は *6/*28 :70%量を目安に減量

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
カンプト	60mg/m ²			↓												
ランダ	30mg/m ²			↓												

①ソルデム3A 500ml (1hr)

グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)

②ソルデム3A 500ml (1hr)

生食500ml+カンプト 60mg/m² (60min)

③ソルデム3A 500ml (1hr)

生食500ml+ランダ 30mg/m² (90min)

④生食50ml (5min)

1時間		1時間		1時間		生食50ml
ソルデム3A 500ml	グラニセトロン オルガドロン	ソルデム3A 500ml	カンプト 生食500ml	ソルデム3A 500ml	ランダ 生食500ml	
30分		1時間		90分		5分

ランダは500mL以上の生食で希釈すること

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

白血球数	3000/mm ³ 以上で実施可能
血小板数	10万/mm ³ 以上で実施可能

・腎機能に応じて、ランダの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	60以上	45を超え60未満	30を超え45未満	30以下
投与量	減量なし	25%減量	50%減量	禁忌