

プロトコール名 胃癌 G-XELOX療法

- 適応 ①治癒切除不能な進行・再発の胃癌
 ②胃癌の術後補助化学療法

- 投与期間 ①3週(2週投与、1週休薬)を1コースとして、効果がある限り継続
 ②3週(2週投与、1週休薬)を1コースとして、8サイクル

薬剤名	基準量
エルプラット	130 mg/m ²
ゼローダ	下記参照

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
エルプラット	130mg/m ²		↓																					
ゼローダ			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

- ①グラニセトロン1B+オルガドロン4A(30min)
 ②5%ブドウ糖500ml+エルプラット 130mg/m² (2hr)
 ③5%ブドウ糖50ml(5min) (Day 1)
 ●ゼローダ 1日2回朝夕食後(Day1夕食後~服用) :C法 (Day1-14)

- 体表面積<1.36m² 1200mg/回(1回4錠)
 1.36m² ≤ 体表面積 < 1.66m² 1500mg/回(1回5錠)
 1.66m² ≤ 体表面積 < 1.96m² 1800mg/回(1回6錠)
 1.96m² ≤ 体表面積 2100mg/回(1回7錠)

グラニセトロン オルガドロン 30分	エルプラット 5%ブドウ糖500ml 2時間	5%ブドウ糖50ml 5分
--------------------------	------------------------------	------------------

エルプラットは5%ブドウ糖注で希釈すること

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

好中球数	1500/mm ³ 以上で実施可能
血小板数	7.5万/mm ³ 以上で実施可能

・腎機能に応じて、ゼロダの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	51以上	30以上50以下	30未満
投与量	初回基準量	1段階減量	禁忌