

プロトコール名 胃癌 S-1+CDDP療法

適応 切除不能進行・再発胃癌

投与期間 3週投与、2週休薬を1コースとして、不応まで繰り返す

投与計画

薬剤名	基準量
TS-1	下記参照
ランダ [®]	60 mg/m ²

薬剤名	投与量	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
TS-1			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															
ランダ	60mg/m2									↓																												

●TS-1 1日2回朝夕食後 (Day1~21)

体表面積<1. 25m² 40mg/回

1. 25m²≤体表面積<1. 50m² 50mg/回

1. 50m²≤体表面積 60mg/回

①ソルデム3A 500ml × 2 (4hr)

②グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)

③生食500ml+ランダ[®] 60mg/m² (2hr)

④ソルラクト500ml × 3 (6hr) (以上Day8のみ)

ソルデム3A 500ml × 2	グラニセトロン オルガドロン	ランダ 生食500ml	ソルラクト 500ml × 3
4時間	30分	2時間	6時間

ランダは500mL以上の生食で希釈すること

●休薬・減量基準

・腎機能に応じて、TS-1及びランダの減量をおこなうこと

Ccr(mL/min)	80以上	60以上80未満	50未満
投与量	初回基準量	初回基準量 ※必要に応じて1段階減量	使用経験なし