

プロトコール名 胃癌 weekly nab-PTX療法

適応 胃癌

投与期間 3週間投与1週間休薬を1サイクルとし、不応まで繰り返す

| 投与計画 | 薬剤名 | 基準量 |
|------|--------|-----------------------|
| | アブラキサン | 100 mg/m ² |

| 薬剤名 | 投与量 | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アブラキサン | 100mg/m ² | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

- ①生食100ml(ルートフラッシュ用)
- ②グラニセトロン1B+オルガドロン4A (30min)
- ③生食50ml+アブラキサン 100mg/m² (30min) **投与前、生食にてルートフラッシュ**
- ④生食50ml (5min)

| | | | |
|---------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 生食100ml | グラニセトロン オルガドロン 30分 | アブラキサン 生食50ml 30分 | 生食50ml 5分 |
|---------|--------------------------|-------------------------|--------------|

アブラキサン投与時はインラインフィルターを通さないこと

アブラキサンは特定生物由来製品であるため使用記録を20年間保管すること

●休薬・減量基準

・次表の基準を参考に、減量・休薬をおこなうこと

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 好中球数 | 1000/mm ³ 以上で実施可能 |
| 血小板数 | 7.5万/mm ³ 以上で実施可能 |
| AST・ALT | 2.5×ULN以下で実施可能 (肝転移症例では5×ULNまで可) |