

## 消化器内視鏡検査時の休薬について

### 1.血栓塞栓症低危険群の場合

|       | 一般名        | 商品名                                   | 生検   |
|-------|------------|---------------------------------------|------|
| 抗血小板薬 | アスピリン(ASA) | バイアスピリン<br>アスピリン<br>バファリン<br>タケルダ(合剤) | 休薬なし |
|       | チエノピリジン    |                                       |      |
|       | ・クロピドグレル   | プラビックス                                |      |
|       | ・プラスグレル    | エフィエント                                |      |
|       | ・塩酸チクロピジン  | パナルジン                                 |      |
|       | チエノピリジン以外  |                                       | 休薬なし |
|       |            |                                       |      |

### \* 血栓塞栓症高危険群とは、以下を指します

心原性脳塞症既往、弁膜症合併心房細動、弁膜症非合併脳卒中高リスク心房細動

#### <抗凝固薬関連>

人工弁設置、抗リン脂質抗体症候群、深部静脈血栓症・肺塞症

冠動脈ステント留置後2ヶ月、肝動脈薬剤溶出性ステント留置後11ヶ月

#### <抗血小板薬関連>

脳血行再建術(頸動脈内膜剥離術、ステント留置)後2ヶ月

主肝動脈50%以上狭窄を伴う脳梗塞または一過性脳虚血発作

閉塞性動脈硬化症Fontaine3度(安静時疼痛)以上

頸動脈エコー、頭頸部MRIで休薬の危険が高いと判断される所見を有する

### 2.血栓塞栓症高危険群\*の場合

|         | 一般名                      | 商品名                                   | 生検             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 凝固薬(AC) | ワルファリンカリウム               | ワーファリン                                | 休薬なし(PT-INR<3) |
|         | ダビガトランエテキジラート            | ブラザキサ                                 | 休薬なし           |
|         | アピキサパン                   | エリキュース                                |                |
|         | リバーロキサパン                 | イグザレルト                                |                |
|         | エドキサパン                   | リクシアナ                                 |                |
| 抗血小板薬   | アスピリン(ASA)               | バイアスピリン<br>アスピリン<br>バファリン<br>タケルダ(合剤) | 休薬なし           |
|         |                          |                                       |                |
|         |                          |                                       |                |
|         |                          |                                       |                |
|         | アスピリン(ASA)+<br>クロピドグレル   | コンプラビン(合剤)                            | 休薬なし           |
|         |                          |                                       |                |
|         | チエノピリジン                  |                                       | 休薬なし           |
|         | クロピドグレル                  | プラビックス                                |                |
|         | プラスグレル                   | エフィエント                                |                |
|         | 塩酸チクロピジン                 | パナルジン                                 |                |
|         | チエノピリジン以外<br>イゴサペント酸エチル  | エパデールS<br>エパデール                       |                |
|         | ω-3脂肪酸エチル                | ロトリガ                                  |                |
|         | シロスタゾール(CLZ)             | プレタール                                 |                |
|         | 塩酸ジラセブ                   | コメリアンコーワ                              |                |
|         | トラピジル                    | ロコルナール                                |                |
|         | ジピリダモール                  | ペルサンチン                                |                |
|         |                          | ペルサンチンL<br>アンギナール                     |                |
|         | 塩酸サルポクレラート<br>ベラプロストナリウム | アンブラーク<br>ドルナー<br>プロサイリン              |                |
|         | リマプロスト<br>アルファデクス        | オパルモン<br>プロレナール                       |                |